

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
СУСТАМХОНДРО

Регистрационный номер: ЛП-005619

Торговое наименование: СУСТАМХОНДРО

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Хондроитина сульфат

Лекарственная форма: мазь для наружного применения

Состав на 1 г:

действующее вещество: хондроитина сульфат натрия (в пересчете на 100 % сухое вещество) – 0,05 г.

вспомогательные вещества: вазелин – 0,485 г; ланолин – 0,15 г; диметилсульфоксид – 0,10 г; моноглицериды дистиллированные – 0,015 г; вода очищенная – до 1 г.

Описание

Однородная мазь светло-желтого цвета со специфическим запахом диметилсульфоксида.

Фармакотерапевтическая группа

Репарации тканей стимулятор.

Код АТХ: M01AX25

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

СУСТАМХОНДРО стимулирует регенерационные (восстановительные) процессы и нормализует обмен веществ в суставном хряще, оказывает анальгезирующее и противовоспалительное действие, замедляет прогрессирование остеоартроза и остеохондроза.

СУСТАМХОНДРО содержит натуральный компонент хондроитина сульфат (высокомолекулярный мукополисахарид), получаемый из тканей крупного рогатого скота. Хондроитина сульфат улучшает фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани, ускоряет процессы ее репарации, тормозит процессы дегенерации (разрушения) хрящевой ткани, препятствует коллапсу соединительной ткани, ингибирует ферменты, вызывающие

повреждение хрящевой ткани, стимулирует синтез глюкозаминогликанов, способствует регенерации (восстановлению) суставной сумки и хрящевых поверхностей суставов, увеличивает продукцию внутрисуставной жидкости. Это приводит к уменьшению болезненности и увеличению подвижности пораженных суставов.

Фармакокинетика

Препарат хорошо всасывается. В соответствии с данными, полученными в экспериментальных исследованиях на мышах с использованием радиомеченого 3Н-хондроитина сульфата, показатель всасываемости хондроитина сульфата составляет 14 %. Диметилсульфоксид способствует лучшему проникновению хондроитина сульфата через клеточные мембраны вглубь тканей. Хондроитина сульфат, после нанесения мази на кожу, быстро и избирательно поступает в сустав с достижением максимальной концентрации через 30 мин и последующим двухфазным выведением препарата из хрящевой ткани. Завершение быстрой фазы выведения происходит через 1 час после применения. Время удержания препарата в суставе составляет 5 часов.

Показания к применению

Лечение и профилактика остеохондроза, остеоартроза периферических суставов и позвоночника.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата. Повреждение целостности кожных покровов в местах предполагаемого нанесения препарата.

С осторожностью

Беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение в период беременности и лактации возможно, когда ожидаемая польза от применения препарата для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Наружно. Мазь наносят 2 - 3 раза в день на кожу над очагом поражения и втирают в течение 2 - 3 мин до полного впитывания. Курс лечения - от 2 - 3 недель до 2 - 3 месяцев. При необходимости – курс лечения повторяют.

Побочное действие

Аллергические реакции.

Передозировка

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

Особые указания

Следует избегать попадания препарата на слизистые оболочки. Не применять препарат без консультации врача при беременности, в период грудного вскармливания, в детском возрасте.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не вызывает седативного эффекта, психомоторных нарушений и не влияет на способность пациента заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психических и двигательных реакций.

Форма выпуска

Мазь для наружного применения 5 %.

По 30 г; 50 г в тубы алюминиевые с внутренним лаковым покрытием с бушонами из полипропилена или полиэтилена низкого давления (высокой плотности).

По 30; 50 г в тубы из комбинированного материала, представляющего собой многослойный ламинат (полиэтилен высокого давления (низкой плотности) – наружный слой корпуса тубы, полиэтилен низкого давления (высокой плотности) – внутренний слой корпуса тубы), с бушонами из полипропилена.

Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата помещают в пачку картонную.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

ЗАО «Зеленая дубрава», Россия, 141801, Московская обл., г. Дмитров, ул.
Профессиональная, д. 151,
тел.: +7 (495) 993-99-95
www.mazi.ru

Владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «Зеленая дубрава», Россия, 141801, Московская обл., г. Дмитров, ул.
Профессиональная, д. 151,
тел.: +7 (495) 993-99-95
www.mazi.ru