

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Метилурацил

Регистрационный номер: ЛС-000775

Торговое наименование: Метилурацил

Международное непатентованное или группировочное наименование:
диоксометилтетрагидропиримидин

Лекарственная форма: мазь для местного и наружного применения

Состав

Действующее вещество: диоксометилтетрагидропиримидин – 10,0 г.

Вспомогательные вещества: вазелин – 45,0 г; ланолин – 31,5 г; вода очищенная – 13,5 г.

Описание

Мазь светло-желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Репарации тканей стимулятор.

Код АТХ: D11AX

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Обладает анаболической активностью. Нормализует нуклеиновый обмен, ускоряет процессы клеточной регенерации в ранах, ускоряет рост и грануляционное созревание ткани и эпителизацию. При наружном применении обладает фотопротекторными свойствами.

Показания к применению

В составе комплексной терапии. Вялозаживающие раны, ожоги, фотодерматит. Профилактика реакций кожи при облучении новообразований с невысокой радиочувствительностью, уменьшения симптомов лучевого дерматита и поздних сращений стенок (окклюзии) влагалища – в случае лучевой терапии новообразований гениталий.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, избыточность грануляций.

С осторожностью

Беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 3 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. При необходимости назначения препарата в период лактации грудное вскармливание следует прекратить.

Способ применения и дозы

Наружно. Местно. Мазь ежедневно наносят на пораженные участки тонким слоем в количестве 5-10 г в течении 15-30 дней. Перед применением рану следует обработать антисептическим и удалить остатки некротических тканей. В случае лучевой терапии новообразований гениталий для профилактики и лечения радиопителита мазь используют в рыхлых тампонах. Курс лечения индивидуален.

Побочное действие

Аллергические реакции в виде зуда, гиперемии и кратковременного жжения.

Передозировка

При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна. При чрезмерном применении возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Препарат совместим с наружными аппликациями антибактериальных и антисептических средств.

Особые указания

Применение у детей до 3 лет, при беременности и в период грудного вскармливания рекомендуется проводить под контролем врача.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Мазь для местного и наружного применения 10 % по 25,0 г или 30,0 г в тубах алюминиевых с внутренним лаковым покрытием с бушонами из полимерных материалов. Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную.

Срок годности

3 года 6 месяцев.

Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

При температуре от 8 до 15 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Отпускают по рецепту.

Владелец регистрационного удостоверения/Производитель/Организация, принимающая претензии от потребителей

ЗАО «Зеленая дубрава», Россия,

141801, Московская обл., г. Дмитров,

ул. Профессиональная, д. 151,

тел.: +7 (495) 993-99-95

www.mazi.ru